



# Profils socio-médicaux des personnes détenues sous traitement de substitution

## Résultats de l'étude RECAMS-Clinsearch

*Ivana Obradovic (OFDT)  
Jean-Noël Marzo (RECAMS)  
Michel Rotily (Clinsearch)*

# Objectifs de l'étude

## *Objectif principal*

Étudier « l'impact » des traitements de substitution par buprénorphine ou méthadone sur la réincarcération évaluée sur une période de 24 mois.

## *Objectifs secondaires*

Analyser les facteurs associés à la poursuite de la substitution pendant l'incarcération.

Etudier la mortalité sur une période de 24 mois chez les usagers d'opiacés selon l'existence ou non d'un traitement de substitution au cours de la détention.

# Comité de pilotage

- RECAMS
- Clinsearch
- OFDT
- GIP Recherche Droit et Justice
- MILDT
- Ministère de la Justice
- Ministère de la Santé (DGS, DHOS)

# Population étudiée

- ***Critères d'inclusion***

Première semaine d'incarcération

Prévenus ou condamnés

Dépendants aux opiacés, quel que soit le mode de prise des opiacés

Bénéficiant ou non d'un traitement de substitution, prescrit avant ou pendant la présente incarcération

Volontaires (lettre de consentement éclairé)

- ***Critères d'exclusion***

Détenus mineurs

Détenus transférés depuis un autre établissement


Refus de participer à l'étude et de signer la lettre de consentement

# Echantillon effectif

**47 maisons d'arrêt  
en France métropolitaine**

**2 régions non représentées:  
Auvergne & Poitou-Charentes**

**507 patients**



# Informations collectées

- ▶ ***Au niveau des maisons d'arrêt (juin 2003 – sept. 2004)***
  - Données socio-démographiques et à caractère pénal
  - Histoire de la toxicomanie
  - Antécédents médicaux
  - Traitement de substitution / Traitements pour le VIH et VHC
  - Psychotropes associés
  
- ▶ ***Au niveau de la Direction de l'Administration Pénitentiaire (septembre 2004, septembre 2005 et septembre 2006)***
  - Réincarcération
  
- ▶ ***Au niveau de l'INSEE-INSERM (septembre 2006)***
  - Mortalité

# Profil général des personnes détenues dépendantes aux opiacés

- Age moyen : 30.8 ans [18-49]

- Sexe : 96% d 'hommes

- Sans enfants : 54%

- Revenus avant l'incarcération :


Activité professionnelle (35%)

RMI (28%)

Alloc.sociales ou à la charge d'un tiers (24%)

Chômage (13%).

## Niveau d'étude



## Logement :

Personnel (37%)


Chez des parents (36%)

Chez des amis ou privé (12%)

Sans logis (10%)


Service d'hébergement (5%)

# Statut de substitution des détenus dépendants aux opiacés (n=500)







# Prescriptions de substitution à l'incarcération




## Des antécédents médicaux plus fréquents parmi les bénéficiaires de TSO




## Une demande de prise en charge plus importante parmi les patients « substitués »




# Détenus dépendants aux opiacés connaissant leur statut sérologique



## Des rapports différenciés à la toxicomanie



# Un passé pénal plus lourd chez les détenus bénéficiaires de TSO



# Conclusion

- Le recours aux TSO a largement progressé en milieu carcéral.
- Différences de profils à l'inclusion : le fait d'être « substitué » apparaît comme un marqueur de fragilité.
- Quelle continuité de l'accompagnement socio-éducatif dans la prise en charge médicale ?