

Les hépatites virales l'inégalité pour tous !

Pascal Mélin



Vous avez un sexe,
du sang,
un foie
et des veines :
Vous êtes concernés

- **L'OMS avait 3 priorités de lutte contre les maladies transmissibles : le paludisme, le VIH et la Tuberculose**
- **Depuis un an, l'OMS reconnaît les hépatites virales**
- **Mais aucun budget n'est dédié à la lutte contre les hépatites**

L'inégalité

- En France
- En Europe
- À l'échelon mondial

L'inégalité en France

- Entre génotype
- Entre malades
- En fonction du lieu d'habitation
(bon de transport)
- En fonction du statut social
(CSAPA, Prison)

L'inégalité en Europe

- L'accès aux tests non invasifs
- Le Fibroscan
- Les greffes
- Les traitements
- Les TROD (Test Rapides d'Orientation Diagnostique)

Systemes de dépistage des anticorps anti-VHC

Tests rapides d'orientation diagnostique (TROD)

Test ELISA 3^e génération

Avantages

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Facilité d'utilisation- Stockage à t° ambiante- Réalisable partout- Sp et Se satisfaisantes | <ul style="list-style-type: none">- Excellente Sp- Grande Se- Automatisation (haut débit)- Réalisation à 37°C- Bonne traçabilité (enregistrement automatique des résultats) |
|--|---|

Inconvénients

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Absence de traçabilité- Lecture subjective (dépendante de l'opérateur)- Elimination des déchets infectieux- Prix élevé (> 10 €) | <ul style="list-style-type: none">- Nécessité de chaînes du froid- Matériel (centrifugeuses) |
|---|---|

Test OraQuick HCV


- Résultats en 20 min.
- Matrices : sérum¹, plasma¹, sang total veineux^{1,2}, sang total capillaire^{1,2} et salive¹
- Se = 98,1 – 99,9 %
- Sp = 99,6 – 99,9 %
- Détection plus précoce par rapport aux méthodes ELISA de 3^e génération

¹Marquage CE ; ²Approbation FDA

Lee SR et al. J Clin Virol 2010;48: 15-7


Lee SR et al. J Virol Methods 2011; 172: 27-31

Etude CHEOBS



- UD actifs ou substitués (N = 244)
- Ex-UD (N = 578)
- Non-UD (N = 1038)

Le cannabis est associé à une meilleure observance et à une meilleure RVS



Sylvestre DL et al. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2006; 18: 1057-63

Bourlière M et al. *Antiviral Therapy* 2011


■ Cannabi (+) ■ Cannabis (-) ★ p = 0,01

L'inégalité dans le monde

- Une ou deux épidémies d'hépatite B
- L'accès à la vaccination
- L'accès aux seringues à usage unique
- L'accès aux traitements

Prévalence des anticorps anti-VHC chez les UVDI

73,8 %



Nelson PK et al. The Lancet 2011; 378: 571-83

Contamination par des injections, réalisées par des soignants chaque année

- Hépatite B : 8 à 16 millions de contaminations
- Hépatite C : 2,3 à 4,7 millions de contaminations
- HIV : 80 000 à 160 000 contaminations

Données OMS

L'accès aux traitements

- Un fond mondial inexistant

L'inégalité

- Nécessite de s'évaluer pour se comparer.
- Est une étape à tout progrès.
- Nécessite des priorisations.

L'inégalité pour tous

Plus qu'un défi,

un devoir !

