

Comportements sexuels à risque et facteurs prédictifs de non utilisation du préservatif parmi les usagers de crack dans les Départements Français d'Amérique

Marie-Claire Parriault, Astrid Van-Melle, Célia Basurko, Larissa Valmy, Bruno Hoen, André Cabié, Marie-Thérèse Goerger-Sow, Mathieu Nacher

Contexte

- Les départements français d'Amérique sont parmi les plus touchés par le VIH.
- Une épidémie concentrée ...
- ... qui touche particulièrement les usagers de crack.



Contexte

- Faible utilisation du préservatif classiquement décrite parmi les usagers de crack.
- Différents facteurs associés (multipartenariat, niveau scolaire, type de relation, violence ...)



Drug and Alcohol Dependence 64 (2001) 97–104



www.elsevier.com/locate/drugalcdep

Intimate relationship characteristics associated with condom use among drug users and their sex partners: a multilevel analysis

Susan G. Sherman *, Carl A. Latkin

Department of Epidemiology, School of Hygiene and Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21205, USA

Received 11 July 2000; received in revised form 30 November 2000; accepted 4 December 2000

Stages of Consistent Condom Use, Partner Intimacy, Condom Use Attitude, and Self-Efficacy in African-American Crack Cocaine Users

Unto E. Pallonen, Sandra C. Timpson, Mark L. Williams, and Michael W. Ross
Center for Health Promotion and Prevention Research, University of Texas Health Science Center at Houston, 7000 Fannin St., Suite 2516, Houston, TX 77030, USA,
Mark.L.Williams@uth.tmc.edu

HIV Risk-Related Sex Behaviors among Injection Drug Users, Crack Smokers, and Injection Drug Users Who Smoke Crack

Robert E. Booth, PhD, John K. Waters, PhD, and Dale D. Chitwood, PhD

Objectif

- Décrire les comportements sexuels à risque et l'utilisation du préservatif parmi les usagers de crack de Guadeloupe, Martinique et Guyane.

Méthode

- Critères d'inclusion :
 - Plus de 18 ans
 - Consommation de crack au cours des 3 derniers mois
- Collecte de données :
 - Entre mars et septembre 2012
 - 640 questionnaires validés
- Questionnaire :
 - 110 questions
 - Adapté des questionnaires BSS
 - Traduit en 5 langues




The image shows a screenshot of a questionnaire form. At the top, there are logos for CIC-EC and other organizations. The title of the form is "QUESTIONNAIRE BSS - VIV". Below the title, there are several sections with labels and corresponding checkboxes or input fields. The sections include "Informations générales", "Consommation de crack", "Impact de la consommation de crack", and "Impact de la consommation de crack sur la vie sociale". Each section has a corresponding label and a series of checkboxes or input fields. The form is in French and appears to be a survey tool used for data collection.



Méthode

- Passation des questionnaires:
 - Face à face
 - Enquêteurs formés et polyglottes
- Echantillonnage combiné:
 - Echantillonnage de convenance au sein des structures (75%)
 - Echantillonnage en snowball en dehors des structures (25%)



Résultats



- Caractéristiques sociodémographiques: une précarisation marquée
 - Majorité d'hommes (79%)
 - 37,6 ans (+/- 9,5) d'âge moyen
 - Majorité de personne de nationalité française (83%)
 - 77% ne vivaient pas en couple
 - Un tiers n'avait pas de couverture sociale
 - 32% vivaient dans un logement précaire ou en rue
 - 37% avaient des difficultés à maintenir leur hygiène corporelle

Résultats




- Sexualité et comportements à risque : cumul de prises de risque
 - Au cours des 12 derniers mois :
 - 46% ont eu au moins un partenaire régulier
 - 38% ont eu au moins un partenaire occasionnel
 - 36% ont eu au moins un partenaire commercial
 - Nombre médian de partenaires : 3,5
 - 2/3 ont eu plus d'un partenaire sur la même période
 - 71% avaient consommé du crack avant un rapport sexuel le mois passé
 - 19% ont déjà subi un viol (53% chez les femmes/10% chez les hommes)
 - 10% déclaraient des ulcérations/lésions génitales au cours des 12 derniers mois. 28% des femmes déclaraient des pertes vaginales anormales
 - 27% n'ont jamais eu de sérologie VIH

Résultats



- Non utilisation du préservatif : tous les types de partenaires concernés



Résultats

	Utilisation non systématique du préservatif au cours des 12 derniers mois /total (%)	Prevalence ratios bruts (95.CI)	Prevalence Ratios ajustés (95.CI)	p
Avec les partenaires réguliers^a				
→ Perception du risque face au VIH				
Elevé	36/37 (97.3)	1.592 (1.108-2.288)	1.972 (1.325-2.934)	0.001
Faible/Ne sait pas/Pas de réponse	154/252 (61.1)	1	1	
Vit en couple				
Oui	83/103 (80.6)	1.414 (1.058-1.889)	1.498 (1.088-2.061)	0.013
Non	102/179 (57.0)	1	1	
Multipartenariat				
Oui	111/194 (57.2)	0.679 (0.506-0.910)	0.669 (0.481-0.932)	0.017
Non	75/89 (84.3)	1	1	
Avec les partenaires occasionnels^b				
→ Perception du risque face au VIH				
Elevé	30/38 (78.9)	2.756 (1.776-4.278)	2.095 (1.275-3.442)	0.003
Faible/Ne sait pas/Pas de réponse	59/206 (28.6)	1	1	
A l'aise pour persuader son partenaire d'utiliser un préservatif				
Oui	43/176 (24.4)	0.375 (0.245-0.576)	0.529 (0.327-0.854)	0.009
Non/Ne sait pas	41/63 (65.1)	1	1	
Vit dans un habitat précaire				
Oui	42/83 (50.6)	1.760 (1.158-2.674)	1.683 (1.068-2.650)	0.025
Non	46/160 (28.7)	1	1	
A déjà été forcé par un partenaire à avoir un rapport sexuel				
Oui	10/44 (22.7)	0.552 (0.286-1.066)	0.574 (0.292-1.126)	0.107
Non	79/192 (41.1)	1	1	
Avec les partenaires commerciaux^c				
→ Perception du risque face au VIH				
Elevé	34/44 (77.3)	3.430 (2.177-5.404)	2.301 (1.322-4.007)	0.003
Faible/Ne sait pas/Pas de réponse	41/182 (22.5)	1	1	
A l'aise pour persuader son partenaire d'utiliser un préservatif				
Oui	27/147 (18.4)	0.305 (0.190-0.489)	0.448 (0.249-0.807)	0.008
Non/Ne sait pas	47/78 (60.2)	1	1	
Age à la fin de la scolarité				
16 ans ou moins	46/109 (42.2)	0.620 (0.388-0.992)	0.695 (0.403-1.200)	0.192
Plus de 16 ans	28/107 (26.2)	1	1	

Discussion



- Cumul de risque et utilisation irrégulière du préservatif

Dans un contexte de :

- Multipartenariat fréquent
- Antécédent de problèmes génitaux
- Recours aux sexe transactionnel fréquent



La non utilisation systématique du préservatif représente un risque de diffusion de l'épidémie

Discussion

- Différents partenaires, différents facteurs associés
 - Avec les partenaires réguliers :
 - vivre en couple,
 - être multipartenaire
 - Avec les partenaires occasionnels : précarité
 - Avec les partenaires commerciaux : capacité de négociation

Discussion

- Perception du risque et capacité personnelle perçue
 - Une perception élevée du risque d'avoir le VIH
➔ une certaine conscience des risques pris
 - Capacité à persuader son partenaire d'utiliser le préservatif
➔ estime de soi / perceived self-efficacy

Discussion

- Limites de l'étude
 - Biais de mémoire
 - Biais de déclaration
 - Biais d'échantillonnage
 - Approche uniquement quantitative

Conclusion

- Optimisation de la prévention chez les usagers de crack
 - Niveau individuel :
 - Réduction des risques
 - Amélioration de la capacité personnelle perçue et de l'estime de soi
 - Combattre les préjugés et la stigmatisations auprès du grand public
 - Niveau institutionnel :
 - Réduction des obstacles à l'accès aux droits, aux soins et à la prévention des usagers de crack.



Merci

aux coordinateurs de terrain : Arlette
Suzanne, Barbara Gontier, Katia
Delagneau, Stéphane Barboza et Jérôme Evanno

À Marcus Day du Caribbean Drug Abuse Research
Institute

aux nombreux partenaires de terrain

à tous les participants