

Présentation des résultats

a m b r e

Acceptation patient et recevabilité
d'une nouvelle forme de buprenorphine



2019

Dr J. Bachellier
CSAPA 37



Liens d'intérêt

Camurus

Indivior

Bouchara

Shire

Janssen

....

CONTEXTE



- Développement des formes « long acting », dont Buprénorphine en solution 'dépôt' injectable (SC) à libération prolongée
- Longue durée d'action → administration hebdomadaire ou mensuelle
- Efficacité similaire mais quelle acceptabilité (patient/soignant) ?
- **OBJECTIFS**
- Évaluer la perception des patients de leur traitement agoniste opioïde actuel
- Evaluer la réceptivité des patients face à une buprénorphine action prolongée en sous cutané
- Identifier le profil optimal des patients pour cette galénique

METHODE

- **Design** : Enquête observationnelle, multicentrique, transversale et nationale.
- **Population** :
 - **Médecins participants (50 attendus)**
 - Spécialistes dans les CSAPA (Environ 15 centres),
 - Médecins généralistes (Environ 30 centres),
 - Spécialistes dans les UCSA (Environ 5 centres)
 - **Patients (300 attendus, 100 par bras)**
 - ≥ 18 ans
 - Actuellement traité (sous prescription médicale) ou initiant un traitement de dépendance aux opioïdes
 - Acceptant de participer à l'étude
 - En mesure de compléter les questionnaires.
- **Sources de données** : Auto-questionnaires patients complétés seuls ou à l'aide d'un tiers, construit en deux parties
- **Période** : février à mai 2019





RESULTATS

DESCRIPTION DES PATIENTS




CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES

(N=366)




Ancienneté de la consommation d'opioïdes : 15 ans en moyenne (médiane à 15 ans) Q8
 Ancienneté de la consommation de TSO : >10 ans pour 49% Q13

Type de TSO (N=366) Q10



Ancienneté du TSO (N=358) Q13




Rappel :
 -patient naïf : primo-prescription de TSO au moment de l'inclusion dans l'étude


Q11		Buprénorphine			
		Subutex (N=102)	générique (N=57)	Suboxone (N=58)	Méthadone (N=138)
Dose quotidienne du traitement prescrite (mg)	Moyenne (±ET)	9,2 (± 6,4)	8,7 (± 5,8)	10,3 (± 5,6)	72,1 (± 52)
	Médiane	8	8	10	60


- 91% des patients prennent toujours ou souvent la totalité de la dose qui leur est prescrite Q19
- Pour 30% des patients (question distincte), la dose restante est gardée pour des réserves personnelles Q20

Pour 43% des patients, la dose prescrite a déjà été inférieure aux besoins dans les 12 derniers mois Q22



■ Oui (N=142)
■ Non (N=186)






* Toutes les modalités « oui » regroupées

RESULTATS
PERCEPTION DU TRAITEMENT
ACTUEL

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AVEC LE TAO DANS LES 12 DERNIERS MOIS

Q23




*Hors méthadone

→ Les difficultés liées au contexte de prise du traitement (déplacement, intimité, contraintes professionnelles) et l'oubli du traitement semblent être les situations les plus fréquemment rencontrées

PLACE DU TAO ACTUEL CHEZ LES PATIENTS (N=366)

Q27


Laquelle de ces propositions vous semble la plus juste ? (Choix unique)



Le TSO semble être un moyen d'arrêter la consommation de drogues pour la majorité des patients

Q30

Souhaitez-vous, à terme, arrêter toute consommation d'opioïdes? (Choix unique)




* Toutes les modalités « oui » regroupées
N=1 donnée manquante

Au total, 84% des patients souhaitent, à terme, arrêter toute consommation d'opioïdes (64,7% « Oui, tout à fait » ; 19,7% « Oui, plutôt »), en particulier les patients méthadone


Q28

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%




Q28

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%




RESULTATS
RESSENTIS SUR LE NOUVEAU
TRAITEMENT

ASPECTS IMPORTANTS DU NOUVEAU TRAITEMENT (N=366)




ATTENTES QUANT AU NOUVEAU TRAITEMENT (N=366)

Q39



CHANGEMENT POUR LE NOUVEAU PRODUIT (N=366)

Q40



N=3 données manquantes

→ 53,2% des patients prêts au changement, en particulier chez les ≥10 ans de TSO (58,6%)

FACON DONT EST PERÇU LE TRAITEMENT (CHAMP LIBRE)

Q36



Mot	Nombre d'apparition	Proportion de répondants l'ayant cité
pratique	64	20,19%
intéressant	27	8,52%
injection	16	5,05%
bien	15	4,73%
facile	15	4,73%
peur	14	4,42%
jours	13	4,1%
prendre	12	3,79%
innovant	11	3,47%
prise	10	3,15%
liberté	10	3,15%
simple	9	2,84%
efficace	9	2,84%
efficacité	8	2,52%
contraignant	8	2,52%
traitement	7	2,21%
facilité	7	2,21%
mois	7	2,21%
penser	7	2,21%
utile	7	2,21%

→ 20,2% des patients ont qualifié spontanément le traitement de « pratique ».

→ Sur les 5 termes utilisés le plus fréquemment pour qualifier le traitement, 80% (4/5) sont positifs

- Les difficultés liées au **contexte de la prise** (intimité, déplacement, contraintes professionnelles) et **l'oubli de la prise** de traitement sont les contraintes les plus rapportées par les patients (38% et 25% respect.)
- Les deux objectifs principaux rapportés par la quasi-totalité des patients avec leur TSO : ne plus ressentir de **manque** + moins de **prises de risque** pour la santé
- 53,2% des patients se sentent **prêts au changement**, dont 58,2% qui pensent que le changement se fera facilement (17,5%) ou plutôt facilement (40,7%)
- L'ancienneté du **TSO > 10 ans**, le fait d'augmenter sa consommation d'autres médicaments par ailleurs, le fait de juger le TSO actuel moins efficace, d'être gêné par le fait de penser au traitement tous les jours , de vouloir moins prendre de risque pour sa santé et de ne plus ressentir de manque et de vouloir arrêter totalement la consommation de drogues sont les facteurs prédictifs de la volonté de changement mais également **patient naif**

Conclusion:

Regard du soignant: usager ou patient ?

Attente dominante: un traitement pratique, discret, à posologie efficace, sans effets secondaires

Où se situe la liberté?

